

แดงโหมทองปลับ

แดงโหมทองปลับ

กลุ่มเกษตรกรชาวตำบลหนองปลับเริ่มปลูกแดงโหมกัน ในปี พ.ศ. 2524 พันธุ์แดงโหมที่นิยมปลูกมี 2 สายพันธุ์ คือพันธุ์เบาที่อายุเก็บเกี่ยวที่ 65 วัน นับ จากวันงอก อีกพันธุ์หนึ่งคือพันธุ์หนักอายุเก็บเกี่ยวที่ 85 วัน นับจากวันงอก ชาวหนองปลับจะปลูกแดงโหมพันธุ์เบา ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้น แล้วสายที่ปลูกก็จะเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการ เช่น พันธุ์กินรี พันธุ์ธารโต เป็นต้น

ฤดูกาลปลูก

แดงโหมทองปลับมักจะปลูกในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปี และจะปลูกในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

ผู้ปลูกจะหาซื้อเมล็ดพันธุ์ตามท้องตลาด จะซื้อพันธุ์ที่ตลาดต้องการมาปลูก เอาเมล็ดแดงโหมแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนำมาห่อผ้าหมาดๆ ทิ้งไว้อีก 1 คืน เมล็ดแดงโหมก็จะเริ่มงอก

ดินและการเตรียมดิน

แดงโหมทองปลับจะนิยมปลูกในนาข้าว ก่อนปลูกผู้ปลูกจะสำรวจดินก่อนว่ามีความเป็นกรดมากน้อยเพียงใด ถ้าสภาพดินมีความเป็นกรดสูงจะทำการปรับสภาพดินก่อน โดยการโรยปูนมาด ปูนขาวโดโรไมท์ หรือใช้ปุ๋ยมูลมูลสัตว์ สภาพดินในเขตตำบลหนองปลับจะเป็นดินร่วนปนทรายพอแห่งจะแตกละแหว่งผู้ปลูกจะปลูกโดยการขุดหลุมกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร แล้วตากดินให้แห้ง เก็บพวกเศษวัชพืชออกแล้วก็จะตีดินให้แตกไม่เป็นก้อนใส่ปุ๋ยชีวภาพลงในก้นหลุม ปุ๋ยชีวภาพที่ใช้จะทำการหมักและผสมเอง ก่อนปลูกจะรดน้ำในหลุมให้เปียกก่อน

วิธีการปลูก

ผู้ปลูกจะนำเมล็ดแดงโหมมาหยอดลงในหลุมที่เตรียมไว้ โดยหยอดลงในหลุมห่างขอบหลุมประมาณ 10-20 เซนติเมตร ประมาณ 5 เมล็ด เวลาปลูกส่วนมากจะเป็นในช่วงเช้าแล้วก็จะรดน้ำวันเว้นวันหรือดูลักษณะดินว่าไม่ให้เปียกชุ่มเกินไป เพราะเมล็ดแดงโหมจะเน่าเสียแต่ถ้าดินแห้งก็จะรดน้ำ พอให้เปียก



โรคและศัตรูพืชที่พบในต้นแดงโหม

- เชื้อรา
- แบคทีเรีย
- หนอนชอนใบ
- รากเน่า ยอดเน่า
- โรคเถาเหี่ยว

วิธีการดูแล

เมื่อเมล็ดแตงเริ่มงอกเป็นต้นอ่อนจะดูแลเรื่องแมลง กับโรคพืชพวกแบคทีเรีย หลังจากแตงโมออกใบจริง 3-4 ใบจะเด็ดยอดทิ้ง ต้นแตงโมจะแตกแขนง 3-4 แขนง เลือกลงที่สมบูรณ์ไว้ หลุมหนึ่ง 3-4 ต้น ประมาณ 1 เดือน ต้นแตงโมจะออกดอก ติดผลให้เด็ดลูกแรกทิ้งเลือกผลที่สมบูรณ์ไว้จะมีลักษณะยาวรี ผู้ปลูกจะคอยตัดแขนงทิ้งจนกว่าจะถึงประมาณข้อที่ 8-10 เพราะลูกที่ติดจะใหญ่สมบูรณ์



การจัดเถาแตงโม

ถ้าปล่อยให้เถาแตงโมเลื้อยและแตกแขนงไปตามธรรมชาติ เถาของแตงโมแต่ละต้นก็จะเลื้อยทับกันและซ้อนกันจนหนาแน่น ทำให้ผลผลิตลดน้อยลง สืบเนื่องจากแมลงช่วยผสมเกสรได้ไม่ทั่วถึงเพราะไม่อาจแทรกหาดอกได้ทั้งหมด ผู้ปลูกจะช่วยจัดเถาวางให้ไม่ซ้อนกันเมื่อเถาแตงโมเริ่มยาว 1-2 ฟุต ก็จะเริ่มจัดเถาแตงโมให้หันไปแนวทางเดียวกัน

การใส่ปุ๋ย

- ใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) รอบๆต้นเมื่อมีใบจริง 4-5 ใบ
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ (15-15-15) รอบๆต้น หรือบางไร่ก็ใช้รองก้นหลุมคลุกเคล้ากับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อไว้ต้นแตงโมที่เติบโตขึ้นมาได้ดูดสารอาหารได้เต็มที่
- ใส่ปุ๋ยเคมีที่สูตรตัวกลางสูง เพื่อเร่งต้นให้เจริญเติบโตได้เต็มที่ เมื่อต้นเจริญเติบโตก็จะทำให้ดอกที่ติดสมบูรณ์ไปด้วย
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรตัวท้ายสูง ปุ๋ยสูตรนี้จะช่วยสร้างแป้งและน้ำตาลจะช่วยเพิ่มความหวานให้แตงโม นอกจากแตงโมมีความหวานตามธรรมชาติอยู่แล้วยังสามารถหวานเพิ่มได้อีก

การเก็บผลผลิต

ผู้ปลูกแตงโมหนองพลับจะตัดเฉพาะแตงโมที่แก่เท่านั้น นี่จึงเป็นเอกลักษณ์ของแตงโมหนองพลับทำไมถึงหวาน เพราะแตงโมที่ตัดมาสามารถนำมากินได้เลยไม่ต้องบ่ม จะมีรสชาติ หวาน กรอบ เนื้อแน่น เปลือกบาง

วิธีการสังเกตว่าแตงโมแก่แล้ว เช่น ขั้วเล็ก ผลแตงมีนวลขาวๆขึ้น การนับอายุ

